

Exercice 1.1. Soient X et Y des ensembles non vides et soit $f: X \rightarrow Y$ une application. De plus, soient $A, B \subseteq X$ et $C, D \subseteq Y$. Montrer les assertions suivantes:

- (a) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.
- (b) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$.
- (c) $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$.
- (d) $f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$.

Exercice 1.2. Pour un ensemble X , l'ensemble des parties de X est défini par

$$P(X) := \{A \mid A \subseteq X\}.$$

- (a) Construire une application injective $f: X \rightarrow P(X)$.
- (b) Montrer que si $g: X \rightarrow P(X)$, alors g n'est pas surjective. [Indication: considérer l'ensemble $A = \{x \in X \mid x \notin g(x)\}$].

Exercice 1.3. Soient X et Y des ensembles non vides, $F \subseteq X \times Y$, et $G \subseteq Y \times X$. Pour $A \subseteq X$ on définit $\phi(A) \subseteq Y$ par

$$\phi(A) := \{y \in Y \mid \exists a \in A: (a, y) \in F\}.$$

De manière similaire, on définit $\gamma(B) \subseteq X$ pour $B \subseteq Y$. Montrer que si $\gamma(\phi(\{x\})) = \{x\}$ et $\phi(\gamma(\{y\})) = \{y\}$ pour tous $x \in X$ et $y \in Y$, alors F est le graphe d'une fonction bijective entre X et Y .

Exercice 1.4. Soit f une application de \underline{n} dans \underline{n} . Montrer que les propriétés suivantes sont équivalentes.

1. f est injective.
2. f est surjective.
3. f est bijective.

Quand l'une des propriétés est satisfaite, on dit que f est une permutation.

Exercice 1.5. Une université a publié les résultats suivants suite à un recensement de ses étudiants : Il y a 10000 étudiants parmi lesquels 2521 sont mariés, 6471 sont des hommes, 3115 ont plus de 21 ans, 1915 sont des hommes mariés, 1873 sont mariés et ont plus de 21 ans et 1302 sont des hommes mariés de plus de 21 ans. Ces nombres peuvent-ils être corrects ?